

## I. Rappels sur les probabilités :

### 1) Probabilité d'un événement :

Un événement est un ensemble de résultats possibles d'une expérience aléatoire.  
La probabilité de l'événement A se calcule avec la formule

$$P(A) = \frac{\text{nombre de cas favorables à A}}{\text{nombre de cas possibles}}$$

### 2) Probabilité de l'événement contraire :

On notera  $\bar{A}$  l'événement contraire de A.

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

### 3) Probabilité de la réunion de deux événements :

On appelle réunion de A et B et on note  $A \cup B$ , l'ensemble des éléments qui sont soit dans A soit dans B soit dans les deux.

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$


### 4) Arbres de probabilités :

#### a) Règles de construction d'un arbre pondéré :

Dans un arbre :

- la somme des probabilités portées par les branches issues d'un même point vaut 1.
- la probabilité d'un événement est égale au produit des probabilités portées par les branches qui aboutissent à cet événement.

#### 2) Arbre pondéré :



$$P(A) + P(\bar{A}) = 1$$

$$P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$$

$$P(A \cap \bar{B}) = P(A) \times P_A(\bar{B})$$

$$P(\bar{A} \cap B) = P(\bar{A}) \times P_{\bar{A}}(B)$$

$$P(\bar{A} \cap \bar{B}) = P(\bar{A}) \times P_{\bar{A}}(\bar{B})$$

$$P(B) = P(B \cap A) + P(B \cap \bar{A})$$

$$P(\bar{B}) = P(\bar{B} \cap A) + P(\bar{B} \cap \bar{A})$$

## II. Les variables aléatoires discrètes :

### 1) Exemple :

On lance deux dés équilibrés, dont les faces portent les nombres de 1 à 6.  
On note les résultats obtenus et on les additionne.  
On note  $X$  la variable qui sera égale à la somme obtenue.

- a) Déterminer tous les résultats possibles pour  $X$ .  
( on présentera les résultats dans un tableau à double-entrée ).

+	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

On voit qu'il y a 36 cas possibles.

Toutes les issues ne sont pas équiprobables.  
On obtient en effet plus souvent le 6 que le 3.

L'ensemble de toutes les valeurs de  $X$ , est :  $\{ 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 \}$

b) Calculer  $P(X = 2) = \frac{1}{36}$        $P(X = 3) = \frac{2}{36}$        $P(X = 6) = \frac{5}{36}$

On regroupe tous les résultats dans un tableau :

$X = x_i$	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$	1

On dit alors que l'on a défini **la loi de probabilité** de **la variable aléatoire  $X$** .

- c) Calculer la moyenne pondérée des valeurs de  $X$ .

**Cette moyenne se note  $E(X)$  et s'appelle l'espérance de  $X$ .**

$$E(X) = \frac{1}{36} \times 2 + \frac{2}{36} \times 3 + \frac{3}{36} \times 4 + \frac{4}{36} \times 5 + \frac{5}{36} \times 6 + \frac{6}{36} \times 7 + \frac{5}{36} \times 8 + \frac{4}{36} \times 9 + \frac{3}{36} \times 10 + \frac{2}{36} \times 11 + \frac{1}{36} \times 12$$

$$E(X) = 7$$

7 est la valeur que l'on pourra espérer pour  $X$  si l'on joue très longtemps.

## 2) Définitions :

Lors d'une expérience aléatoire, on obtient un certain nombre d'issues.

Lorsqu'à chaque issue, on associe un nombre réel, on dit que l'on définit une **variable aléatoire**.

**Cette variable aléatoire est en général notée  $X$ .**

**Définir la loi de probabilité de la variable aléatoire  $X$ , c'est calculer, pour chaque valeur possible de  $X$ , la probabilité de l'obtenir.**

On regroupera les résultats dans un tableau de ce type :

$X = x_i$	$x_1$	$x_2$	...	...	...	$x_n$	TOTAL
$P(X = x_i)$	$P(X = x_1)$	$P(X = x_2)$	...	...	...	$P(X = x_n)$	1

L'espérance de la variable aléatoire  $X$  est notée  $E(X)$  et elle vaut :

$$E(X) = P(X = x_1) \times x_1 + P(X = x_2) \times x_2 + \dots + P(X = x_n) \times x_n$$

**Elle représente la moyenne pondérée des valeurs de la variable aléatoire  $X$ .**

**Elle représente la valeur que l'on espérera obtenir pour  $X$  après un très grand nombre d'expériences.**

## III. Loi de Bernoulli :

### 1) Définition:

On appelle **épreuve de Bernoulli** une expérience aléatoire qui n'a que deux issues, **le succès noté  $S$**  et l'échec noté  $\bar{S}$ .

Si l'on reproduit plusieurs fois, de manières identiques et indépendantes, la même épreuve de Bernoulli, on représente la situation par **un arbre de probabilités** et on calculera les probabilités demandées grâce à l'arbre.


## 2) Exemple:

Un exercice se présente sous la forme d'un QCM comportant 3 questions.  
Pour chaque question, il y a 4 réponses proposées. 1 seule est exacte.  
On notera  $S$  l'événement " l'élève coche la bonne réponse ".

a) Calculer  $P(S)$ .

$$P(S) = \frac{1}{4} \text{ donc } P(\overline{S}) = \frac{3}{4}$$

b) Illustrer la situation par un arbre de probabilités.



c) Si un élève répond au hasard à toutes les questions, quelle est la probabilité qu'il ait :  
aucune bonne réponse :

$$\frac{3}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{27}{64}$$

La probabilité de n'avoir aucune bonne réponse est  $\frac{27}{64}$ .

une seule bonne réponse :

$$\left(\frac{3}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{4}\right) \times 3 = \frac{9}{64} \times 3 = \frac{27}{64}$$

La probabilité d'avoir une bonne réponse est  $\frac{27}{64}$ .

deux bonnes réponses :

$$\left(\frac{3}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{4}\right) \times 3 = \frac{3}{64} \times 3 = \frac{9}{64}$$

La probabilité d'avoir deux bonnes réponses est  $\frac{9}{64}$ .

trois bonnes réponses :

$$\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{64}$$

La probabilité d'avoir trois bonnes réponses est  $\frac{1}{64}$ .